

دستورالعمل کنترل کرم عوامل خسارت‌زای انار

۱- بهداشت باغ: میوه‌های آلوده انار روی درخت و کف باغ در طول فصل (بویژه میوه‌های ریخته شده در ابتدای فصل) و نیز پس از برداشت بصورت همگانی در منطقه جمع‌آوری و در محل از قبل تعبیه شده در هر باغ انباشته و در اوایل اردیبهشت (قبل از ظهور گل‌های انار) در زیر خاک مدفون گردند. ضمناً رعایت کلیه اصول باغبانی از جمله هرس، تغذیه و آبیاری مطابق توصیه‌های کارشناسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

۲- روش پرچم زدایی: حذف پرچم‌گله‌ها و میوه‌های انار با دستگاه پرچم‌زدای دستی در خرداد ماه (زمان دقیق عملیات در مناطق مختلف، حدود ۲ تا ۳ هفته پس از اوج گلدهی درختان انار و یا ۵ تا ۶ هفته پس از ظهور اولین گل‌های انار که در این زمان پرچم‌های اکثر گله‌های انار خشکیده شده است، می‌باشد).

۳- کائولین‌فرآوری شده (سپیدان wp) برای کاهش خسارت آفتاب‌سوختگی: کاربرد کائولین‌فرآوری شده با غلظت ۵ درصد (چهار مرحله از اواخر خرداد به فواصل ۲۰ روز)

۴- رهاسازی زنبور تریکوگراما: استفاده از سوش منطقه با نظر کارشناسان (۱۰ الی ۱۵ بار رهاسازی)

۵- ترکیبات آفت‌کش گیاهی تنداکسیر و یا پالیزین برای کنترل آفات مکنده: کاربرد ترکیبات گیاهی با غلظت ۲ در هزار (در صورت بالابودن جمعیت شته و یا کنه، به فاصله ۵ الی ۷ روز تکرار گردد)

توجه: در صورت کاربرد کائولین‌فرآوری شده جهت آفتاب‌سوختگی، نیاز به محلول‌پاشی جداگانه جهت کنترل کنه نخواهد بود)